


CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM GASTROSTOMIA / JEJUNOSTOMIA

O que é gastronomia?

Os candidatos a este procedimento são os pacientes com várias patologias que impedem a ingestão de dieta pela via oral ou sonda por tempo prolongado, necessitando, desta forma, da construção cirúrgica de uma passagem diretamente para o estômago.

A sonda de gastrostomia poderá ter balonete ou um anteparo interno tipo "cogumelo".

GASTRONOMIA



Cuidados com a Gastrostomia

- **LAVAGEM DAS MÃOS ANTES E APÓS QUALQUER MANIPULAÇÃO**
- Limpeza do local da gastrostomia / jejunostomia com soro fisiológico 0,9%, secar bem após lavagem. Na residência, poderá ser limpo o sítio da sonda com água morna e sabão neutro, secando bem após com gaze.
- Não manter gaze na pele
- Limpeza sempre que houver secreção
- Manter sonda fixa na pele, com esparadrapo anti-alérgico
- **Não tracionar**
- Manter sonda sempre fechada enquanto não estiver em uso
- Atentar para sinais de vermelhidão, secreção purulenta e dor local – contactar o médico responsável
- Observar diariamente a marcação ou numeração da sonda _____ cm
- Observar extravazamento de dieta pelo óstio (orifício da gastrostomia/jejunostomia) – comunicar imediatamente o médico.
- Fornecer a dieta sempre com **cabeceira elevada ou o paciente sentado**
- Oferecer a dieta com seringa.
- **Por equipo comum fazer em _____ minutos**

- Lavar a sonda com 20 a 50 ml de água filtrada após dietas e/ou medicações
- Após a dieta, manter paciente sentado ou com a cabeceira elevada por pelo menos 60 minutos ou a critério médico
- Diluir bem as medicações antes de administrar. lavar a sonda após as medicações.

Lembrete!

- Em caso de náuseas ou vômitos durante a alimentação contate o médico e retarde em 1 hora a administração da dieta
- Não administrar a dieta na gastrostomia rapidamente, pode causar ânsia e vômito.
- Qualquer alteração com a saída acidental da gastrostomia / jejunostomia entrar em contato com o médico imediatamente.
- Caso obstrução da sonda entrar em contato com seu médico.
- Observe o aspecto do estoma (orifício da pele por onde sai a sonda), notando a presença de vermelhidão ou vazamento do conteúdo gástrico sobre a parede abdominal, contate o médico.
- Não pinçar ou clampear o tubo, principalmente com pinça.

Referências:

Patient Care Manual – Gastrostomy Balloon Replacement Tube, Wilson Cook Medical Inc.-A Cook Group Company, 1998